

Haderslev Kommunes forholdsregler i forbindelse med børns sygdom

Gældende for daginstitutioner og den kommunale dagpleje

Sygdom	Forholdsregler
Bylder	Barnet må først modtages når betændelsesstedet er tørret ind.
Børnesår	Barnet må ikke modtages, før såret er helet op, og skorpen er faldet af.
Børneorm	Barnet må komme i institution efter 1 dags behandling.
Diarré	Barnet holdes hjemme til afføringen er normal.
Fnat	Barnet må komme i institutionen når behandlingen er begyndt.
Forkølelse	Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal.
Forkølelæssår	Kun ringe smitterisiko ved almindelige forkølelæssår. Ingen karantæne.
Fåresyge	Barnet holdes hjemme til hævelsen er forsvundet.
Halsbetændelse	Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal. Hvis barnet får penicillin, kan det tidligst sendes i institution efter 2 dages behandling.
Hoste	Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal.
Hånd-, fod- og mundsygdom	Når almentilstanden er upåvirket, også selv om der er udslet.
Influenza	Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal.
Kighoste	Barnet holdes hjemme til hosteanfaldene ikke giver anledning til problemer. Børn under 1 år, der ikke har fået 2. kighostevaccination (DTRP-vacc.), skal hjemsendes.
Lungebetændelse	Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal.
Lus	Barnet holdes hjemme til behandling er påbegyndt.
Lussingesyge	Ingen karantæne. Derimod specielle forholdsregler for gravide medarbejdere.
Mellemørebetændelse med øreflåd	Se yderligere oplysninger
Mæslinger	Barnet holdes hjemme i mindst 5 dage efter udslættets udbrud og til temperaturen har været normal i et par dage.
Opkastninger	Barnet holdes hjemme til opkastningerne er holdt op og temperaturen er normal.
Ringorm	Barnet må gerne komme i institution efter påbegyndt behandling, da der kun er ringe smitterisiko.
Røde hunde	Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal.
Skarlagensfeber	Barnet holdes hjemme i mindst 2 dage efter penicillinbehandlingen er begyndt.
Skoldkopper	Barnet holdes hjemme til skorperne er tørre.
Spoleorm	Barnet må gerne komme i institutionen efter påbegyndt behandling. God hygiejne nødvendig.
Tredjedagsudslæt	Se yderligere oplysninger
Øjenbetændelse	Barnet holdes hjemme til øjet ikke længere er sammenklistret. Ved lettere øjenbetændelse (som bl.a. ses ved forkølelse) er der ingen karantæne.